

群馬県 農地土壌中の放射性セシウムの分析値

地図No	採取市町村	採取日			現況	放射性Cs濃度(Bq/kg) ¹			2012年12月28日を基準日とした値 (Bq/kg) ¹			備考
		年	月	日		Cs-134	Cs-137	Cs合計	Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	前橋市	2012	8	28	普通畑	35	55	90	31	55	86	
2	前橋市	2012	8	28	普通畑	34	61	95	31	61	91	
3	榛東村	2012	9	3	普通畑	55	97	150	50	96	150	
4	吉岡町	2012	9	4	普通畑	30	50	80	27	50	77	
5	伊勢崎市	2012	8	28	普通畑	29	47	76	26	46	72	
6	藤岡市	2012	9	4	普通畑	17	34	51	15	34	49	
7	富岡市	2012	8	31	普通畑	40	65	110	36	64	100	
8	上野村	2012	8	30	普通畑	52	84	140	46	84	130	
9	神流町	2012	8	30	普通畑	17	35	52	16	35	50	
10	下仁田町	2012	8	30	普通畑	39	68	110	35	67	100	
11	中之条町	2012	11	16	普通畑	110	200	310	110	200	310	
12	長野原町	2012	8	28	普通畑	59	100	160	53	100	150	
13	嬬恋村	2012	8	2	普通畑	39	71	110	34	70	100	
14	高山村	2012	11	16	普通畑	67	130	200	65	130	190	
15	東吾妻町	2012	9	12	樹園地	83	130	210	75	130	200	
16	片品村	2012	8	6	普通畑	67	110	180	59	110	170	
17	川場村	2012	9	12	普通畑	210	370	580	190	360	560	
18	沼田市	2012	8	21	普通畑	73	120	190	65	120	180	
19	沼田市	2012	7	3	普通畑	200	310	510	170	310	480	
20	昭和村	2012	7	30	普通畑	51	93	140	45	92	140	
21	太田市	2012	5	7	水田	38	55	93	31	54	85	
22	館林市	2012	4	18	水田	63	89	150	50	88	140	
23	板倉町	2012	4	18	水田	61	100	160	48	100	150	
24	千代田町	2012	4	18	水田	69	100	170	55	98	150	
25	邑楽町	2012	5	7	水田	73	110	180	59	110	170	

¹ 土壌中の放射性セシウム濃度値は、有効数字(2桁のものは2桁、3桁のものは上から2桁、4桁以上のものは上から3桁)にしているため計と内訳が一致しない場合がある。

² 地図No.は、各地域ごとに北から割り振っている。

³ データ採取地点の選定に際し放射性Cs濃度の高い地域を重点化した自治体もあり、各自治体における平均的・代表的な濃度分布を示すものではない。