



# 農林水産研究 推進事業の取組

令和3年度版

特集① 「みどりの食料システム戦略」  
関連の主要な研究成果

特集② 最新の成果  
(令和2年度終了課題から)



# 目次

ページ

## 特集① 「みどりの食料システム戦略」関連の主要な研究成果

01：施設園芸の再生可能エネルギー活用技術	1
02：病害抵抗性品種など海外植物遺伝資源の導入	1
03：養豚のGHG排出を削減する飼料設計	2
04：環境応答性や無花粉性を備えるスギ育種素材	2
05：天然資源に依存しないウナギ養殖技術	2

## 特集② 最新の成果（令和2年度終了課題から）

★ 薬用作物	需要高まる薬用作物の省力安定生産技術	5
機能性食品	機能性表示による特産物の高付加価値化	7
★ 遺伝資源	病害抵抗性品種など海外植物遺伝資源の導入	9
野生動物被害	ニホンジカ・イノシシの分布、農林業被害予測	11
鳥獣対策	イノシシの行動特性を利用した新型捕獲技術	13
山地災害	先端リスク評価による山地計画支援技術	15
人工スギ	高度なスギの生産力推定モデルを開発	17
★ 花粉対策	環境応答性や無花粉性を備えるスギ育種素材	19
赤潮対策	赤潮発生・終息早期予測、底質改善技術	21
養殖場選定	養殖場選定のための微生物学的評価技術	23

注) ★印は特集①「『みどりの食料システム戦略』関連の主要な研究成果」で取り上げた課題

## これまでの主な成果

### 地球温暖化に対応する研究開発

水田作	暑さに強く、たくさんとれる「にじのきらめき」	27
果樹	温暖化によるナシの発芽不良対策技術	29
果樹	温州みかんの浮皮軽減技術	31
★ 施設園芸	施設園芸の再生可能エネルギー活用技術	33
★ 畜産	養豚のGHG排出を削減する飼料設計	35
水産	高水温に適応した養殖ノリの育種技術	37

### ICT等の先端技術を活用した研究開発

農業機械	超省力作業を実現する農機ロボット化技術	39
農業機械	農作業の軽労化に貢献するアシストスーツ	41
用排水	高度な用排水管理・最適化技術の開発	43
林業	ITによる効率的な林分材積推定技術	45

### バイオマス・バイオマテリアルに関する研究開発

カイコ	カイコによる有用物質の効率的な生産技術	47
バイオマス	木質リグニン由来の最先端工業材料	49

### 生産現場の課題を解決する研究開発

水田作	中食・外食のニーズに応える水稻新品種	51
水田作	お米のヒ素・カドミウムを同時低減する技術	53
畑作	健康機能性が話題のもち麦「キラリモチ」	55
畑作	莢がはじけにくく収穫ロスが少ない大豆	57
野菜	業務・加工用タマネギ、キャベツの開発	59
果樹	実需ニーズに応える加工用果樹品種・技術	61
花き	夏場における花きの安定供給技術	63
畜産	飼料用米による畜産物の高付加価値化	65
畜産	畜産経営における悪臭低減技術の高度化	67
★ 水産	天然資源に依存しないウナギ養殖技術	69
病害虫	遺伝子情報による重要病害虫迅速同定法	71
農地	農地等の放射性物質の除去・低減技術	73

注) ★印は特集①「『みどりの食料システム戦略』関連の主要な研究成果」で取り上げた課題

# 特集 ①

## 「みどりの 食料システム戦略」 関連の主要な研究成果

農林水産業の生産力の向上と持続性の両立に貢献する研究成果をピックアップしました！

### 化石燃料を使用しない園芸施設への移行

施設園芸の再生可能エネルギー活用技術（33ページ）



**施設園芸**において、作物の局所加温技術、燃油加温機から発生するCO<sub>2</sub>を回収して作物へ施用するシステム等を開発し、生産者向けの手引きを作成して普及を図っています。局所加温用テープヒータやCO<sub>2</sub>貯留・供給装置は民間企業で市販化され、農業者に導入されています。

開発した技術は農業経営の安定化につながるほか、CO<sub>2</sub>排出量の削減という地球温暖化対策への貢献、地域の再生可能エネルギーの有効利用による分散型エネルギー・システムの確立・地域活性化への貢献も期待されます。

再生可能エネルギーを活用する次世代園芸施設

### 化学農薬使用量の低減

病害抵抗性品種など海外植物遺伝資源の導入（9ページ）

ラオスやカンボジア等5ヶ国との二国間共同研究を通じて、野菜類など約2,000点の植物遺伝資源を収集し、我が国で問題になっている病虫害などに対抗できる遺伝資源を見出しました。また、収集した遺伝資源のデータベースを構築することで、育種に携わる公的機関等の関係者が効率的にアクセスできるようになりました。

品種開発が加速し、化学農薬使用量の低減等の課題解決に活用することが期待されます。



キュウリ炭疽病菌株に対して抵抗性を示すキュウリ（左）  
(抵抗性品種により化学農薬使用量の低減が可能に)

# CO<sub>2</sub>ゼロエミッション化の実現

## 養豚のGHG排出を削減する飼料設計 (35ページ)

03



アミノ酸バランスを改善した飼料の給与

ふん尿から排出される**GHG（温室効果ガス）を削減する飼料設計を確立**しました。この飼料は給与しても豚の成長に使われない余剰のアミノ酸を削減しており、肥育に影響を与えることはありません。また、養豚農家は慣行飼料とほぼ同価格以下で購入できるため、新たなコスト負担は生じません。

本飼料設計を活用した飼料は、温室効果ガス排出削減量を認証する制度（J-クレジット）において、国内畜産初の方法論になり、これにより**環境に貢献する豚肉を消費者へ提案する宮崎県のプロジェクト**が生まれました。今後も持続可能な畜産に向けた取組が期待されます。

# 04 エリートツリー等の成長に優れた苗木の活用

## 環境応答性や無花粉性を備えるスギ育種素材 (19ページ)

多様なスギ系統の乾燥ストレス耐性をフィールド試験と人工制御環境での試験の両面から評価する技術や、少/無花粉性を効率的に判定する遺伝情報技術等の開発により、「**環境応答性や少/無花粉性を兼ね備えるスギ**」の作出が可能になりました。

わが国で初めてとなる**気候変動適応策に資する造林の育種素材を作出する技術**であり、従来手法では多大な年月と労力がかかる品種開発期間を10年以上短縮しました。

優良スギ系統の一部はすでに育種現場へ導入されており、将来の気候変動下での森林整備に貢献することが期待されます。



成長に優れる優良スギ系統

# 天然資源に負荷をかけない持続可能な養殖

## 天然資源に依存しないウナギ養殖技術 (69ページ)

05



大量生産が可能になった人工シラスウナギ

成長が不安定だった**人工シラスウナギの大量生産システム**を開発し、天然シラスウナギと遜色ない人工シラスウナギを育てることができるようになりました（令和元年6月）。

現在は人工シラスウナギの商業規模での供給に向けた実証試験を行っています。

今後、人工シラスウナギを大量に安定供給できるようになれば、採捕量が減少している**天然資源に依存しないウナギの完全養殖を商業化**できると期待されます。



# 特集 ②

## 最新の成果

〔令和2年度  
終了課題から〕

機能性表示により  
納豆市場の拡大に期待！



イトミミズ等の微生物叢から  
養殖場としての適性を評価！

イノシシの警戒心を逆手に  
とって取り逃しを防止！

トウキ、ミシマサイコ、カンゾウ、オタネニンジン、シャクヤク

## 需要高まる薬用作物の省力安定生産技術



イメージ

国内で需要が高まる薬用作物（トウキ、ミシマサイコ、カンゾウ、オタネニンジン、シャクヤク）の生産拡大に向けて、雑草対策や収穫機、栽培判断技術など、**省力的かつ安定的に生産する技術を開発**しました。

薬用作物を既存の地域の農業体系に導入し、収益を確保できる経営モデルを盛り込んだ手引きを活用して普及に取り組んでいます。中山間地域などで導入され、**新たな産地の誕生が期待されます。**

薬用作物栽培を  
最大8割省力化  
新たな産地形成、  
生薬の安定共有に  
期待



普及に向けて薬用作物の栽培方法と開発技術を解説した冊子を配布



中山間地におけるミシマサイコの栽培風景

研究代表機関

農研機構

プロジェクト名

薬用作物の国内生産拡大に向けた技術の開発

研究期間


平成28年度～  
令和2年度

〔 共同研究機関：医療基盤・健康・栄養研究所、山形県、静岡県、三重県、奈良県、徳島県、佐賀県、宮崎県、  
県立広島大学、千葉大学、福島県立医科大学、十勝農業協同組合連合会、(株)夕張ツムラ 等 〕


## 研究背景

漢方製剤等の原料となる生薬は国内需要の約9割を輸入に頼っていますが、輸入元の海外において環境保全等の観点から採取や輸出を規制する動きがあり、安定的な調達が難しくなりつつあります。

国内の中山間地域では、地域の活性化につながる作物として薬用作物栽培への関心が高まっていますが、一方で、薬用作物は収穫までに複数年かかるものが多く、使用できる農薬や機械が少ないとことから、省力的な管理技術や、多様な気象・土壌条件に適した安定生産の方法が求められています。



漢方製剤等の原料使用量および生産国（2016年度）



漢方製剤等の国内生産金額（億円）の推移  
(一般用および医療用医薬品)

## 主要な成果

- ① カンゾウ収穫機やオタネニンジンの早期育苗など5品目で省力管理技術を開発 → 除草や収穫など**作業時間を最大8割削減**、オタネニンジンの**育苗期間を半減**（2年→1年）
- ② トウキの収穫適期推定プログラムや5品目の病害関連研究など安定生産技術を開発 → 省力化しても**慣行栽培と同等以上の収量**見込み
- ③ 栽培暦や既存の生産体系へ薬用作物の導入を図る経営モデル、技術マニュアルを作成 → 中山間地での**新たに産地を形成**し、地域の活性化、原料生薬の安定供給に期待



カンゾウ収穫機による収穫作業



薬用シャクヤク品種「べにしづか」



## 健康機能性の解明、機能性向上技術の開発

# 機能性表示による特産物の高付加価値化



イメージ

納豆の粘り成分( $\gamma$ -ポリグルタミン酸)が血糖値の上昇を押さえることや、へちまには高めの血圧を低下させる成分(GABA)が多く含まれることなど、**地域特産物の健康機能性を解明**するとともに、その**健康機能性成分の含有量をより高める加工技術を開発**しました。

今後、納豆やへちまを機能性表示食品として届出することとしており、**地域農産物の高付加価値化**により地域の活性化や国民の健康増進への貢献が期待されます。

地域特産物の  
健康機能性解明  
市場拡大  
地域の活性化



$\gamma$ -ポリグルタミン酸の含有量が大きく、  
粘り気が強い納豆



煮汁まで食べることで余すこと無く  
GABAの摂取が可能（写真はへちまの味噌汁）

### 研究代表機関

農研機構

### プロジェクト名

地域の農林水産物・食品の機能性発掘のための研究開発

### 研究期間


平成28年度～  
令和2年度

〔共同研究機関：国立がん研究センター、筑波大学、タカノフーズ（株）、琉球大学、沖縄県 等〕

## 研究背景


超高齢社会の現在において、食を介した健康維持増進への関心は高く、また、2015年の機能性表示食品制度の開始以来、機能性表示による地域特産物の高付加価値化が期待されています。

これまでに追跡研究の結果等から、大豆食品やアブラナ科野菜等の健康機能性が注目されてきました。そこで、更なる疫学調査を行い、茨城の納豆や沖縄のへちま等の各地域の特産物について、機能性成分を維持・向上させる栽培・加工技術の開発や機能性表示に必要なヒト介入試験の実施等により、地域特産物を活用した機能性表示食品の開発を目指しました。



7割以上の人人が日頃から、健全な食生活を心掛けている

資料：農林水産省「食育に関する意識調査」



健康食品市場規模推移 (令和2年度は見込値)

注：メーカー出荷金額ベース

出典：(株)矢野経済研究所「健康食品市場に関する調査(2021年)」  
資料を引用し、一部改変

## 主要な成果

① アブラナ科野菜等の摂取による全死亡リスク低下等の関連性をデータ解析し、文献化


→ アブラナ科野菜等の健康機能性の妥当性を裏付け、**消費者理解を促進**

② 納豆<sup>ガム</sup>γ-ポリグルタミン酸の食後血糖上昇抑制効果を解明し、高含有製法を確立

→ 年間約2,700億円の納豆市場の更なる拡大へ期待

③ へちまの安定生産技術を開発、真空包装により高めの血圧を抑えるGABAの増加を確認

→ へちま等地域特産物の付加価値向上、市場拡大へ期待



へちまの真空包装によるGABA含量の上昇



真空包装したへちま

## 画期的な品種開発につながる遺伝資源の開拓

## 病害抵抗性品種など海外植物遺伝資源の導入



イメージ

2,000点の海外  
遺伝資源を収集、  
品種開発に  
新たな道筋

ラオスやカンボジア等5ヶ国との二国間共同研究を通じて、野菜類など約**2,000点の植物遺伝資源**を収集し、我が国で問題になっている病虫害などに対抗できる遺伝資源を見出しました。また、収集した遺伝資源のデータベースを構築することで、**育種に携わる公的機関等の関係者が効率的にアクセス**できるようになりました。

品種開発が加速し、**化学農薬使用量の低減等の課題解決**に活用することが期待されます。



少数民族の村を訪問し、栽培している作物を提供してもらう（ラオス、ナス遺伝資源）



特性評価の様子（ソルガム）

### 研究代表機関

農研機構

海外植物遺伝資源の民間等への提供促進

### 研究期間

平成30年度～  
令和2年度

共同研究機関：国際農研、茨城県、新潟県、愛知県、奈良県、岡山県、高知県、宮崎県、鹿児島県、京都大学、信州大学、筑波大学、東京農業大学、弘前大学、南九州大学、山形大学、龍谷大学 等

## 研究背景

わが国の農業生産は生産者の減少や高齢化に加え、自然災害や温暖化の進行、グローバル化の進展など、多くの課題に直面しており、画期的な新品種育成による国内農業の強化が強く求められています。たとえば、温暖化で発生拡大が懸念される病害に対して、抵抗性品種の開発が期待されますが、新品種の開発には国内のみならず海外の植物など、多様な遺伝資源が必要です。

遺伝子情報解析技術の進展で、今まで利用できなかった遺伝資源も活用の道が拓けており、遺伝資源の重要性が高まっています。



温暖化により被害が拡大しているキュウリ  
炭疽病症状（既存品種では対応できない）



多様な在来品種が栽培されている  
(カンボジア、キュウリ遺伝資源)

## 主要な成果

① 海外遺伝資源を2,000点収集、  
種子増殖や特性評価を実施

→ 活用可能な遺伝資源が増え、  
**国内の品種開発が活発化**

② 収集した遺伝資源の特性評価  
や遺伝子情報のデータベース  
を構築

→ **効率的にアクセス可能**、  
品種開発が加速

③ 既存技術では対応できない  
強毒型炭疽病などに対抗できる  
遺伝資源を発見

→ **抵抗性品種の作出**により、  
**化学農薬使用量の低減**も可能に



強毒型炭疽病菌株に対して強度抵抗性を示す  
キュウリ遺伝資源（左）



抵抗性品種を加害するネコブセンチュウに対し  
強度抵抗性を示すトウガラシ遺伝資源（左）



## 野生動物識別キット・目撃情報マップの構築 ニホンジカ・イノシシの分布、農林業被害予測




イメージ

野生動物分布拡大  
の最前線を把握、  
農林業被害を予測  
地域の取組活性化

野生動物分布拡大の最前線を把握する手法として、**食痕等からDNA分析によって種判別**する方法や、**目撲情報等収集システムの構築と活用**を進めました。

また、全国スケール及び地域スケールで**ニホンジカ、イノシシの将来分布・被害を予測**しました。

野生動物による被害拡大阻止の取組が進展し、地域ネットワークの創出や地域活動の活性化が期待されます。



シカ識別キットとシカ情報マップ



地域の取組（捕獲シカ回収作業）

研究代表機関  
森林総合研究所

プロジェクト名  
野生鳥獣拡大に係る気候変動等の影響評価


研究期間  
平成28年度～  
令和2年度

〔 共同研究機関：愛知県、自然環境研究センター、（株）マップクエスト 〕

## 研究背景


農林業に被害をもたらす野生動物の生息域(分布域)は、平成26年度までの過去36年間に、ニホンジカでは約3倍、イノシシでは約2倍に拡大しました。分布域の拡大は農林業へ被害をもたらし、経営意欲の減退を加速させ、それが野生動物による更なる被害を招くという悪循環を生んでいます。

被害拡大を防ぐためには、まず、現場でどのような動物が被害をもたらしているのか、また、今後どのような被害が予想されるのか的確に把握することが必要です。このため、本研究では、生態学的、行動学的な知見を現在の状況に当てはめて、加害動物の分布域の最前線を把握する取組を進めました。



ニホンジカの分布域拡大

資料：環境省「ニホンジカ及びイノシシの生息分布調査」を基に森林総合研究所作成




野生動物による農作物被害額の推移

## 主要な成果

- ① 自動撮影等の利用、識別検査薬と食痕試料を用いた動物種判定（識別キット）の実用化 → 痕跡等で野生動物の存在を把握、**特異的な対策が可能**に
- ② Webベースの地理空間情報を用いた野生動物目撃情報等収集システムの構築・活用 → 新規分布情報を迅速に把握し、**早期対策が可能**に
- ③ 全国規模での分布域を予測、農林業被害の拡大を予測 → **地域の防除対策取組を推進**、今後の管理計画遂行に寄与



中国地方におけるシカ分布域拡大



北東北地方における水稻・飼料作物・果樹の被害発生予測

問合せ先

農林水産技術会議事務局 研究開発官（基礎・基盤、環境）室



03-6744-2216

## 野生動物の行動特性を解明、ICTセンサーの活用

# イノシシの行動特性を利用した新捕獲技術



イメージ

侵入防止策と  
新型センサー搭載  
の箱わなで  
被害9割低下も

イノシシ等野生動物の警戒心を利用した  
新型の箱わなやセンサーを開発しました。


イノシシが警戒心から箱わなの外へ後肢  
を残すことや、自ら扉を押し開けると警戒  
が抑えられることが分かり、これらの行動  
特性を利用して捕獲率を向上しています。

また、野生動物の体長を測定して成獣を  
選択的に捕獲可能な新型センサーは、開発  
時から普及が進み、1,200基以上が国内に  
導入されています。

防護柵などと組み合わせた総合的な対策  
を進め、農作物の被害減少が期待されます。



自ら扉を押し開け箱わなに入るイノシシ



侵入防止柵と新型センサー付き箱わなでの被害（赤色）低減

研究代表機関

農研機構

プロジェクト名

野生鳥獣被害拡大への対応技術の開発

研究期間

平成28年度～  
令和2年度

〔 共同研究機関：アイエスイー（株）、兵庫県立大学、三重県農業研究所、タイガー（株）〕

## 研究背景

野生動物による農業被害を防ぐためには、適切な環境管理や防護柵の設置など侵入防止策を実施した上で、加害個体を確実に捕獲することが重要です。「箱わな」は比較的実践しやすい手法ですが、自治体が把握している箱わなの半数以上が年間1頭も捕獲できていない現状があります。

このため、捕獲できない問題点を動物の行動から明らかにし、ICTを組み合わせ捕獲率を高めるとともに、地域で取り組みやすい軽量かつ低コストな箱わなの開発を目指しました。また、侵入防止対策との組み合わせによる地域ごとの対策を検討しました。



被害軽減には防御と捕獲が重要



警戒して後肢をわなの外へ残す行動特性

## 主要な成果

① 後肢を残す、自ら侵入すると慣れるなどイノシシ等の行動特性を踏まえた箱わなを開発


→ 「取り逃がし」が減少し、警戒心の強い個体を捕獲することで捕獲期間を短縮

② 成獣を選択的に捕獲可能で餌付時から赤外線に慣れさせる機能搭載のセンサーを開発


→ 新型センサーは、これまで1,200基以上導入

③ 柵の適切な設置・管理でイノシシ・シカの被害を減少

→ 箱わな等と合わせて総合マニュアル化、**地域の取組推進**



イノシシの行動特性を踏まえた箱わなのイメージ



新型センサー付の箱わなで採餌するイノシシ



## 防災機能の発揮と収益性確保を両立

# 先端リスク評価による山地計画支援技術




イメージ

防災と経営を両立する新しい森林計画技術  
地域の防災と林業活性化へ貢献

山地の防災と経営を両立させる森林計画の策定を支援する技術を開発しました。

災害リスクと収益性によって色分けされた地図やチェックリストにより、「災害を防ぐために伐採を避ける場所」及び「林道開設により収益性が高くなる場所」の把握が容易になります。

本技術を活用して、岐阜県等で森林ゾーニング策定のため技術支援を実施するなど、地域における安全な森林整備の促進、林業の活性化への貢献が期待されます。



災害リスクと収益性によって色分けした地図



現地での意見交換

#### 研究代表機関

森林総合研究所

#### プロジェクト名

山地災害リスクを低減する技術の開発

#### 研究期間

平成28年度～  
令和2年度

〔共同研究機関：秋田県、長野県、岐阜県、奈良県、兵庫県、鳥取県、岩手大学、京都大学、東京大学、宮崎大学、朝日航洋（株）、（株）ノーザンシステムサービスシステム〕

## 研究背景


近年、極端気象による土砂災害が頻発しており、山地災害リスクの低減が喫緊の課題となっています。

一方で、林業の活性化により林業区画の樹木を全て伐採するような収穫（皆伐）が増加しており、皆伐・植林からの20年間は根が十分に張らないため、土砂災害の発生リスクが高くなると言われています。

そのため、森林の防災機能の発揮と林業の活性化を両立し、山地災害リスクのある場所を見出して、より安全な森林管理を行うことが出来る技術の開発が求められていました。



山地災害の現場  
(平成30年西日本豪雨)




皆伐からの20年間は、樹木の根の働きが弱くなる  
(「北村・難波、1981」)を一部改変

## 主要な成果

- ① 森林の斜面崩壊に対する防災機能の予測技術を開発
- ② AIなどを取り入れ、山地防災と森林経営を統合的に判断するゾーニング技術を開発
- ③ 山地災害に関する地理情報配信プラットフォームを構築

- 防災効果マップにより地域の森林の**防災機能を可視化**
- 安全な作業道の設置など**防災と両立させる森林計画の策定**が可能に
- 自治体や民間事業者が**自ら災害リスクを検討可能**に



AIによるCS立体図からの森林路網（青線）の抽出例

損壊しやすい急斜面に作設され、保全対象にも近いため、優先的な維持管理の検討が必要



チェックリストにより安全な作業道設置の検討が可能

問合せ先

農林水産技術会議事務局 研究開発官（基礎・基盤、環境）室



03-6744-2216

# 気候変動の影響を評価、スギ生産力の減少をシミュレーション 高度なスギの生産力推定モデルを開発



イメージ


スギ人工林の生産力を推定するモデルを構築し、将来の気候変動の影響を全国で評価しました。特に強い気候変動が進行した場合、全国の約半分の地域で生産力が減少する可能性もあります。

気候変動の影響を踏まえて、林業指導者が地域の森林配置を検討することで、将来的に安定した森林経営へ寄与することが期待されます。

## スギ人工林への 気候変動の 影響を評価、 1kmメッシュで 全国マッピング



林業指導者養成研修において将来の森林計画立案者に成果を受け渡し



市町村森林整備計画における  
将来の森林の配置の検討

資料：八代市森林整備計画（H30～H40）から一部抜粋

研究期間

研究代表機関

プロジェクト名

森林総合研究所

人工林に係る気候変動の影響評価


平成28年度～  
令和2年度

〔 共同研究機関：信州大学、岐阜大学 〕

## 研究背景

気候変動の森林への影響については、ブナ林などの自然植生の適域の変化などが報告されています。一方で、人工林への影響は、乾燥により、スギの脆弱地域が将来的に増加する可能性が報告されました。実際に雨の降らない日は増加傾向にあり、今のペースで乾燥化が進むと、水収支の観点において、スギは衰弱することが実験で確認されています。

スギの成長には水分条件だけでなく様々な環境条件が影響します。安定した森林経営のためには、地域ごとの多様な環境条件でどの程度成長できるか正確な予測が必要です。このため、水収支だけでなく、造林木の様々な環境条件における成長や生理応答など生産力全体を評価する高精度な影響評価が求められていました。



一年間に雨が降らない日数は増加傾向

資料：気象庁Webサイト「過去の気象データ検索」




土壤の乾燥によりスギが徐々に衰弱していく際の水分条件以外の環境条件を明らかにする必要があった



資料：長倉ら (2011) 森林総合研究所研究報告, Vol.10:263-279

## 主要な成果

- ① 将来の総合的環境条件を反映させたスギ人工林の生産力シミュレーションモデルを構築 → 全国的な**気候変動適応への取組に貢献**
- ② 従来の10kmメッシュのマップを高度化、スギの生産力も組み込んだ1kmメッシュの気候変動評価マップを作成 → 地域の森林整備計画の木材生産機能の**森林配置の検討における重要な判断材料**を提供
- ③ 気候変動の進み方によるスギ生産力への影響の違いを検証 → **気候変動の進行程度を考慮しながら森林配置を検討する必要性**を示唆



温度上昇が大きいほど生産力が減少する地域(赤部分)が増加



気候変動の進み方とスギの将来生産力を精緻に検証

問合せ先

農林水産技術会議事務局 研究開発官（基礎・基盤、環境）室



03-6744-2216


乾燥耐性や成長性、花粉発生等の性質を遺伝学的に評価

## 環境応答性や無花粉性を備えるスギ育種素材



イメージ

全国356系統を  
網羅的に評価  
候補遺伝子を数万  
から数十に特定  
優良19系統を作出



解析対象とした全国各地の試験地と  
区域ごとの系統数

多様なスギ系統の乾燥ストレス耐性を  
フィールド試験と人工制御環境での試験の  
両面から評価する技術や、少/無花粉性を  
効率的に判定する遺伝情報技術等の開発に  
より、「**環境応答性や少/無花粉性を兼ね  
備えるスギ**」の作出が可能になりました。

わが国で初めてとなる**気候変動適応策に  
資する造木林の育種素材を作出する技術**で  
あり、従来手法では多大な年月と労力がかかる  
品種開発期間を10年以上短縮しました。

優良スギ系統の一部はすでに育種現場へ  
導入されており、将来の気候変動下での森  
林整備に貢献することが期待されます。

育種基本区	育種区	系統名	選抜都県	公表年
東北	東部	耐寒風青森30号	青森県	令和2年
関東		西多摩8号	東京都	平成30年
		中4号	神奈川県	平成30年
	関東平野	箱根4号	神奈川県	平成30年
		片浦6号	神奈川県	平成30年
		丹沢2号	神奈川県	令和元年
中部山岳		奈良井4号	長野県	平成30年
東海		天竜11号	静岡県	平成30年
		大井7号	静岡県	
関西	日本海岸西部	大原1号	島根県	令和2年
九州	北九州	県神埼1号	佐賀県	平成30年
	中九州	県大分1号	大分県	令和2年

開発した遺伝情報技術（DNAマーカー）により  
無花粉遺伝子を保有するスギ系統を特定

### 研究代表機関

森林総合研究所

### プロジェクト名

気候変動に適応した花粉発生源対策スギの作出技術開発

### 研究期間

平成28年度～  
令和2年度

〔 共同研究機関：九州大学、岡山県、愛媛県、宮崎県 〕

## 研究背景

地球温暖化に疑う余地はなく、最も厳しい温室効果ガスの削減努力を行った場合にも想定される気候変動に対処するため、短期的な対応だけでなく中長期的な気候変動適応を目指すことが重要です。

このため、本研究では、気候変動によるリスクとして乾燥や高温等が懸念される中、林業の生産性と健全性を維持する観点も踏まえ、環境ストレスへの応答や少/無花粉性に着目し、将来の森林整備に貢献する林木育種の基盤技術の開発に取り組みました。




## 主要な成果

- ① 全国の大規模な系統のデータを活用、乾燥に対する成長性を葉の生理活性等から評価 → 優良系統の選抜期間を10年以上短縮
- ② 乾燥耐性や少/無花粉性を効果的に判定可能な遺伝情報技術を開発 → 表現型では捉えきれない詳細なストレス応答等を早期に判定可能
- ③ 乾燥耐性や成長性、無花粉性等の特性をランキング、スギ育種素材を19系統作出 → 環境応答性や成長性に優れ、少/無花粉性を兼ね備えるスギ品種の開発に活用



人工的に環境制御した栽培試験を実施、サーモグラフィー等を活用した環境応答性の評価技術を開発



遺伝子活性を比較する技術により、乾燥ストレスに強いスギ系統を見出すことが可能



# AI等の活用「エコミクス解析」、養殖場海底の電位モニタリング 赤潮発生・終息早期予測、底質改善技術




イメージ

赤潮発生の3日前  
予察、終息も予測  
し早期対処可能に  
海底モニタリング  
で汚染進行を抑制

AI等最先端の手法を用いて海中環境を解析する「エコミクス」という概念を拓き、**赤潮の発生・終息を早期に予測する技術**を開発しました。被害が甚大になる前に、早期水揚げ、生け簀移動などの対処が可能となります。

また、世界で初めて**電位に基づき海底環境を把握するシステム**を構築し、**養殖場環境の改善技術**を開発しました。コストを数万円に抑え、クルマエビ水槽で汚染の進行を抑制する効果が認められています。



現場で適用可能なエコミクス解析スキーム



電位のモニタリングで養殖場環境の環境保全

## 研究代表機関

早稲田大学

## プロジェクト名

有害プランクトンに対応した迅速診断技術の開発

## 研究期間

平成28年度～  
令和2年度

〔共同研究機関：理化学研究所、水産研究・教育機構、長崎県総合水産試験場、高知大学、宮崎大学、鹿児島大学、日本ソフトウェアマネジメント（株）〕


## 研究背景

赤潮の発生は漁業に甚大な影響を及ぼし、1回の赤潮で数十億円の被害が発生することもあります。クロマグロ養殖は日本の水産業を支える柱の1つとして重要視されていますが、本種は赤潮に対してきわめて弱いため、赤潮の発生にいち早く対処し、その拡大・衰退を知ることが重要です。

このため、最先端の手法を用いて、海中の遺伝情報や代謝物、物性情報等を長期モニタリングにより解析し、赤潮の発生を3日前迄に予察する技術、終息を予測する技術、ならびに漁場環境を測定する技術の開発を目指しました。




生け簀内で斃死した養殖魚 (KTN長崎テレビより引用)




養殖マグロ出荷量の経年推移 (MF21ウェブページより引用)

## 主要な成果

- ① 赤潮発生を3日前までに予察可能な機器を開発 → 養殖魚の早期水揚げ、生簀の移動などの対処が可能
- ② 有害プランクトンから抽出した代謝物（グルコース/グリシン比）等により赤潮終息を予測 → 科学的根拠に基づく生簀移動や餌止め期間の決定が可能
- ③ 世界で初めて、電位に基づき海底環境の状況を把握 → 養殖場海底の環境保全に貢献



AI等による赤潮発生の高精度予測のイメージ



赤潮終息を計る指標としてグルコース/グリシン比を発見




# 海底の微生物叢から養殖場としての適性を読み解く 養殖場選定のための微生物学的評価技術



イメージ

## 海底堆積物中の微生物機能を解明 合理的に養殖場を選定する技術



養殖場海底の微生物環境

海底堆積物中の微生物環境を調べることで、その**海域の養殖漁場としての適性を評価する技術**を開発しました。

赤潮発生の可能性、海底環境の強靭さなど、養殖場として満たすべき微生物学的条件についてのデータを「**漁場適性カルテ**」として提供することで、より合理的な漁場選定が可能になります。

これにより、次世代の養殖漁場へ豊かな海を継承します。

海域名( )	試料採取日( )	18Sメタ解析	定量PCR
<b>有害微細藻</b>			
Alexandrium leei			
Alexandrium spp.			
Heterocapsa circularisquama			
Prorocentrum mikimotoi (水母)			
Cochliodinium polykratoides			
Chattonella spp.			
		休眠期細胞	
<b>珪藻</b>			
Skeletonema spp.			
Chaetoceros spp.			
Thalassiosira spp.			
		個体密度	
<b>ペントス</b>			
海産ミミズ			
イトゴカイ			
コケゴカイ			
ヒメゴカイ			
カンザシゴカイ			
		メタゲノム解析	
<b>追加項目</b>			
細菌叢			
ウイルス叢			
寄生性真核生物			
ラビリンチュラ			

コメント欄:  
(例:有害藻類のシグナルはAlexandrium spp.のみ、ペントスの個体群組成から、きわめて高い有機物分解ポテンシャルを有すると考えられる。また、ラビリンチュラの多様性も高く、難分解性物質の処理という面でも頑強な海域である。)

漁場適性カルテの一例  
(様々なパラメータから適性を評価する)

## 研究代表機関

高知大学

## プロジェクト名

微生物学的情報に基づく漁場適性評価技術の開発

## 研究期間

平成28年度～  
令和2年度

〔 共同研究機関：水産研究・教育機構、北里大学、甲南大学 〕


## 研究背景

養殖場を作るには大きな投資が必要となるため、現場の漁業者にとって養殖に適した海域の選定は重要です。これまでの研究から、養殖場の適性評価には、有害プランクトンの発生による赤潮や、エサなど有機物の分解等にかかわる海底の微生物環境が重要と考えられます。

このため、本研究では、有害プランクトンの休眠細胞（シスト）など海底堆積物（底質）の微生物環境に着目して、漁場環境としてふさわしい微生物環境を維持するための要件を明らかにし、科学的根拠をもって漁場適性を評価する技術を開発することとしました。



有機物分解を担う海底生物（ベントス）  
(ヒメナイワンイトミミズ)



新奇な赤潮の原因となる藻類の一種  
(*Alexandrium leei*)

## 主要な成果

① 有害プランクトン等をDNA特異的に検出、解析する技術を開発

→ 海域毎の赤潮発生の危険性を推し量るデータを提供



② 有害プランクトン等を抑制する寄生生物（ツボカビ類）やベントスを発見、解明

→ 環境の強靭さを計る鍵となるベントス種等を決定


③ 沿岸域寄生生物（ラビリンチュラ類）が微細藻類の分解及びDHA※産生に関与することを解明

→ 渔場評価パラメータの一項目としてラビリンチュラ類の重要性を新たに証明

※ DHA：ドコサヘキサエン酸、魚類の必須脂肪酸

各種能力	海産ミミズ	イトゴカイ	コケゴカイ	ヒメゴカイ	カンザシゴカイ
飼育後の底質の様子					
シスト発芽抑制能	◎	○		◎	
遊泳細胞捕食					○

各種ベントスの有害プランクトンに対する阻害効果



問合せ先


農林水産技術会議事務局 研究開発官（基礎・基盤、環境）室



03-6744-2216



# これまでの主な成果



## 虹のように多彩な特性、艶やかなご飯

# 暑さに強く、たくさんとれる「にじのきらめき」



イメージ

コシヒカリより  
高温・病気に強く  
3割多収、  
さらにおいしい  
期待の水稻品種

コシヒカリより多彩な特徴を併せ持った  
新品種「**にじのきらめき**」を育成しました。

本品種は、これまでの高温登熟耐性品種  
の多くが備えていなかったイネ縞葉枯病等  
に抵抗性があり、農薬散布を減らした低コ  
スト栽培が可能です。また、北陸および関  
東以西の幅広い地域で栽培が可能で、広く  
普及が見込まれます。

平成30年に品種登録出願されてから、岐  
阜県では**大手米卸が地元JAに働きかけて産  
地化し、外食チェーン向けに米を供給**して  
います。栃木県、茨城県などでも普及が広  
がりつつあります。



栽培講習会には多くの生産者が参加  
するなど、高い関心（写真：岐阜県）



安定した品質が魅力の「にじのきらめき」の  
生産に、JA・米卸業者・カレーチェーン店が連携

## 研究代表機関

農研機構

## プロジェクト名

温暖化の進行に適応する品種・育種素材の開発

## 研究期間

平成27年度～  
令和元年度


[ 共同研究機関：北海道、宮城県、栃木県、三重県、和歌山県、福岡県、九州大学、神戸大学 等 ]

## 研究背景

温暖化の進行に伴い、イネの実る期間が高温傾向になると、米の一部又は全部が白く濁った白未熟粒の発生が増加し、米の食味や精米したときの歩留まりの低下や、それによる販売価格の低下を招くことが問題となっています。

また、中食・外食ニーズが増加し、収量向上のため多肥料でも倒れにくく、縞葉枯病などの防除コストが低減できる品種が必要とされています。

これらのニーズに対応するため、多彩な特徴を併せ持つ水稻品種「にじのきらめき」を育成しました。（平成30年、品種登録出願）



白未熟粒 断面 正常粒 断面

白未熟粒の割合が高いと品位、食味が低下する



イネ縞葉枯病の症状 ヒメトビウンカ

イネ縞葉枯病は、生育不良や穂の異常につながり、減収をもたらす（媒介するヒメトビウンカは、麦作地帯で発生しやすい害虫）

## 主要な成果（「にじのきらめき」の特性）

① 高温でもよく実り、  
イネ縞葉枯病に抵抗性をもつ

→ **高温傾向でも安定生産**が可能で、  
イネ縞葉枯病が多い**麦作地帯へ  
の普及も容易**

② やや大粒で、茎が短くて  
倒れにくい


→ コシヒカリに比べて  
**15~30%多収**

③ コシヒカリと同等の食味

→ **実需者が求める美味しいお米**



茎が短いため倒伏に強く収穫量が多いため、  
高い収益性が見込まれる



コシヒカリと同等の極良食味米



# 発芽不良発生メカニズムの解明と対策技術の開発

## 温暖化によるナシの発芽不良対策技術



イメージ

すぐに取り組む  
ことが可能で、  
負担のない  
温暖化対策技術

温暖化により九州地方で増加・深刻化している**ニホンナシの発芽不良**を軽減するため、肥料散布時期の変更など、**すぐに取り組むことができるコストのかからない対策技術**を開発しました。

温暖化の進行に伴い、**今後、全国的な発芽不良の発生が懸念**されることから、本対策技術は、**より広範な地域において有効**な対策技術として活用されることが期待されます。



ニホンナシ発芽不良対策マニュアルを  
生産現場へ配布



肥料散布時期を春に変更した  
ニホンナシの開花の状況

## 研究代表機関

農研機構

## プロジェクト名

温暖化の進行に適応する生産安定技術の開発

## 研究期間

平成27年度～  
令和元年度

[ 共同研究機関：北海道、宮城県、富山県、和歌山県、鹿児島県、東京大学、東北大学 等 ]

## 研究背景

温暖化により、冬の間に果樹の花芽が枯死すると「発芽不良」が発生し、春になっても発芽や開花をしません。

特にニホンナシの発芽不良は、鹿児島県をはじめ、九州各県で暖冬年に多発し、大きな問題となっています。温暖化の進行に伴い、今後、暖かい地域を中心に発芽不良の広域的な発生が懸念されることから、発生メカニズムの解明と対策技術の開発を行いました。



発芽不良の発生状況  
手前側：発生樹、奥側：正常樹




花芽の枯死による発芽不良の様子  
左側：枯死芽、右側：健全芽

## 主要な成果

- ① 樹体の窒素含有量が多くなると越冬中の耐凍性が低下し、発芽不良発生の原因となることを解明 → 発芽不良の発生メカニズムを解明したことで、**効果的な対策技術の開発を可能に**
- ② 窒素を多く含む肥料や堆肥の散布時期をずらす発芽不良対策技術を開発 → 生産者の負担がなく**すぐに取り組むことが可能**
- ③ 対策技術を体系化し、マニュアル化 → 産地や生産者などの全国の**生産現場への円滑な普及**が可能



発芽不良発生のメカニズム



肥料や堆肥の散布時期の違いが  
花芽の枯死率に及ぼす影響



# 地球温暖化適応技術の開発

## 温州みかんの浮皮軽減技術




イメージ

1回の薬剤散布で  
浮皮の発生程度を  
半減、  
商品果率を向上

**温州みかん**は我が国で最も生産量の多い果実ですが、近年の地球温暖化の進行により浮皮の多発が問題になっていました。

そこで、輸送・貯蔵中の腐敗や、食味に影響を及ぼす「浮皮」を軽減する技術を確立し、主産地である和歌山県や静岡県において効果が実証されました。

省力的な薬剤散布などの対策を体系化し普及することで、熊本県では導入する生産者が増加しており、**散布面積が増加**（平成26年：17ha→平成30年：165ha）しています。



薬剤散布時期等の浮皮軽減技術を体系化したマニュアルを全国に配布して普及を促進



栽培講習会には多くの生産者が参加し、対策技術を導入する生産者が増加

## 研究代表機関

農研機構

## プロジェクト名

地球温暖化が農業分野に与える影響評価と適応技術の開発

## 研究期間


平成22年度～26年度

[ 共同研究機関：和歌山県、福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、鳥取大学 等 ]

## 研究背景

近年、西日本を中心として温州みかんの浮皮の発生が増加しています。浮皮とは、温州みかんにおいて著しく果皮と果肉が分離した状態で、この症状になると、果皮が傷つきやすくなるため「腐敗しやすい」、「輸送性が低下する」などの問題が発生します。温度が高いほど浮皮になりやすいことが示されており、地球温暖化がその原因として指摘されています。

今後、さらなる地球温暖化が予想されている中で、浮皮を軽減する技術の確立が求められていました。



温暖化が進むと、現在の温州みかんの栽培適地では、高温障害の増加が懸念される



浮皮は温度や湿度が高いほど、  
果皮と果肉が分離してしまう生理障害

## 主要な成果

① 植物成長調整剤であるGa※とPDJ※の混合液1回の散布によって浮皮の発生を抑制する技術を開発

※Ga: ジベレリン

PDJ: プロヒドロジャスモン酸

→ 省力的かつ安定的に**浮皮の発生程度を半減**し、果実腐敗の低減により**商品果率を向上**

② 薬剤散布に伴う着色遅延に対応する技術を開発(貯蔵やマルチシート被覆等)


→ 浮皮軽減効果を保持し**着色遅延を緩和**、時期をずらした**有利販売を可能**に

③ 摘果等により結実量を調整する等、産地や品種に合った技術をマニュアルとして体系化

→ 全国で栽培されている温州みかんに適用可能で**取り組みやすい**



樹上にある果実に省力的な薬剤散布（静岡県）



GaとPDJの混合液を散布した場合、無処理の場合と比べて浮皮発生程度が約半減する



# 最適な温度制御、地中熱・太陽熱、排気中CO<sub>2</sub>の利用 施設園芸の再生可能エネルギー活用技術



イメージ

地域資源を活用し  
燃油使用量半減、  
暖房コスト8割減  
等の経営効果を  
実証



普及に向けて、導入技術の費用対効果等を  
示した冊子を配布



地域資源を活用した再生可能エネルギー等の利活用技術の開発



出典：環境のための農  
山漁村×SDGsビジ  
ネスモデルヒント集



農林水産業から地球温暖化対策と  
SDGs達成に貢献！

## 研究代表機関

農研機構  
岐阜大学

## プロジェクト名

地域資源を活用した再生可能エネルギー等の利活用技術の開発

## 研究期間


平成25年度  
～28年度

〔 共同研究機関：奈良県、山口県、静岡大学、東京大学、(株)ジオシステム、フタバ産業(株) 等 〕


## 研究背景

施設園芸では、ハウス内の加温や、光合成の促進を目的としてCO<sub>2</sub>濃度を高めるため、化石燃料を多く使用しています。

しかし、地球温暖化対策としてCO<sub>2</sub>排出量の削減が重要であり、また、燃油価格の変動に左右されにくい安定的な農業経営のためにも、化石燃料依存からの脱却に向けた技術の開発が求められました。



農林水産業からの温室効果ガス排出量（2018年度）  
燃料燃焼による排出が最も多く占めている



農業用A重油の価格の推移（資料：農業物価統計）  
年により大きく変動

## 主要な成果

① イチゴ、ナス、ガーベラ等を局所的に加温する技術を開発

→ ハウス全体の加温と比べ、品質・収量を保ちつつ**燃油使用量を半減**

② 浅層地中熱ヒートポンプを開発

→ 従来型（ボアホール型）に比べて**初期コストを4割削減**

③ イチゴ高設栽培において、太陽光を蓄熱・利用する栽培ハウスを開発

→ 収量を確保しつつ**暖房コストを8割削減**


④ 燃油加温機の排気中のCO<sub>2</sub>を回収して作物へ施用するCO<sub>2</sub>貯留・供給システムを開発

→ 加温機からの**CO<sub>2</sub>排出量の削減**とともに**作物の生育促進も可能**に



◆テープ状の発熱器によるガーベラのクラウン（株元の肥大した短縮茎）の局所加温

太陽光蓄熱利用型高設栽培ハウス▶



## 飼料のアミノ酸バランスを改善

# 養豚のGHG排出を削減する飼料設計



イメージ

GHG排出量を  
4割削減、慣行  
と同価格以下で  
経営規模にかか  
わらず導入可能

ふん尿から排出される**GHG（温室効果ガス）を削減する飼料設計を確立**しました。この飼料は、給与しても豚の成長に使われない余剰のアミノ酸を削減しており、肥育に影響を与えることはありません。また、養豚農家は慣行飼料とほぼ同価格以下で購入できるため、新たなコスト負担は生じません。

本飼料設計を活用した飼料は、温室効果ガス排出削減量を認証する制度（J-クレジット）において、国内畜産初の方法論になり、これにより**環境に貢献する豚肉を消費者へ提案する宮崎県のプロジェクト**が生まれました。今後も持続可能な畜産に向けた取組が期待されます。



豚への飼料給与



アミノ酸バランス改善飼料

## 研究代表機関

農研機構

## プロジェクト名

農業分野における温暖化緩和技術の開発


## 研究期間

平成22年度  
～26年度

## 研究背景

持続可能な養豚業を目指すために、環境に配慮した経営が求められています。我が国の農林水産から排出される温室効果ガスのうち約3割が排せつ物等による畜産からの排出です。また、養豚の排水中のふん尿由来の窒素は、浄化処理により低減していますが、今後、排水基準の引き下げが予想されています。

浄化処理施設の増強により窒素排出量の削減等も実現できますが、施設の更新・改修には多くの費用がかかるため、経営規模にかかわらず経費を抑えて環境に配慮した養豚経営ができる技術の開発が求められていました。



農林水産分野の温室効果ガス排出の現状（平成29年度）（令和元年度食料・農業・農村白書より）



家畜排せつ物の有効利用のため堆肥化等が行われていますが、その処理時もGHGが排出されています

## 主要な成果

① アミノ酸バランス改善飼料により養豚由来のふん尿中の窒素排せつ量を減少させる技術を開発


→ CO<sub>2</sub>換算で**汚水処理時のGHGを4割削減**可能とし、河川湖沼の自然環境に与える影響も減少

② アミノ酸バランスを調整し、慣行飼料と同額以下の飼料を開発


→ 経営規模にかかわらず導入可能

③ 排出削減量を認証する制度（J-クレジット）において国内畜産初の方法論として確立

→ 環境に配慮した**養豚経営のインセンティブ**に



豚の成長に使われない余剰のアミノ酸を減らしたアミノ酸バランス改善飼料を給与することで、排せつされる窒素が減少



アミノ酸バランス改善飼料は慣行飼料と比べてGHGを4割削減可能



# プロトプラスト選抜による画期的な育種技術 高水温に適応したノリの育種技術




イメージ

画期的な育種技術  
で、温暖化に適応  
したノリの品種開  
発に道筋

温暖化の影響で海水温が上昇し、ノリの養殖可能な期間が短くなっています。

そこで、従来の方法よりも短期間で効率の良い育種が可能になるプロトプラスト選抜を用いた**画期的な育種技術を開発**しました。現在、この技術を用いて**高水温に適応したノリ品種を開発**する実証試験が行われています。

環境変動に適応した品種の開発技術が確立されれば、**安定的なノリの生産が可能**となり、産地の活性化が期待されます。



海藻類で初のプロトプラスト（矢印）を用いた選抜育種技術の開発



安定生産により産地を活性化

## 研究代表機関

水産研究・教育機構

## プロジェクト名

温暖化の進行に適応するノリの育種技術の開発

## 研究期間

平成25年度～  
平成29年度


〔 共同研究機関：— 〕

## 研究背景

ノリはわが国で養殖されている魚介藻類の中で最も収穫量が多い重要な産業種です。

近年、温暖化によって海水温が上昇し、有明海等の生産地では養殖に適した水温 $23^{\circ}\text{C}$ 以下になる時期が遅れ、栽培期間が短くなっただけでなく、病害も多発するようになります。ノリの生産量が減少しています。


そこで、生産現場からのニーズを踏まえ、水温 $24^{\circ}\text{C}$ 以上でも2週間以上生育可能な品種の開発を行いました。



海面養殖業魚種別生産量  
(資料: 農林水産省海面漁業生産統計調査)



高水温のノリへの影響



海水温の低下が遅れることで  
収穫期間が短くなる

## 主要な成果

※プロトプラスト: 海藻類の細胞から細胞壁を取り除いた細胞

ノリ葉状体 → プロトプラスト → 成熟を待たずに短期間で育種が可能となる効率的なノリ育種の基盤技術を確立



プロトプラスト選抜を用いた育種技術


## 衛星測位システムによる自動走行技術の開発・実用化

# 超省力作業を実現する農機ロボット化技術



イメージ

耕うん、田植え、稻刈りを自動化  
有人・無人の協調システムでは  
作業時間4割減



農業用自動操舵システムの北海道向け出荷台数の推移  
(資料：北海道農政部調査)

**農機のロボット化に不可欠な基礎技術を開発**し、ロボットトラクタ、ロボット田植機、ロボットコンバインの開発に大きく貢献しました。

これらの成果を基に、研究開発事業において複数の農業用ロボットを操作する世界初のマルチロボットシステムなどが開発され、**ロボットトラクタの市販化**が実現しました。**農作業の一貫したロボット化**により大規模かつ低コスト生産が可能になります。

北海道では農業用自動操舵システムの出荷が年々増加（平成26年度：480台→令和元年度1,990台）しており、農業用ロボット技術の普及が進んでいます。



衛星測位システム受信機

## 研究代表機関

北海道大学

## プロジェクト名

低成本・省力化、軽労化技術等の開発

## 研究期間


平成22年度～  
平成26年度

[ 共同研究機関：農研機構、帯広畜産大学、京都大学、(株)日立ソリューションズ、ヤンマー(株) 等 ]


## 研究背景

農業就業人口の大幅な減少や高齢化が進行する中で、水田作等の土地利用型農業では、作付面積の維持・拡大のため、経営面積が年々増加しています。

このような状況で、限られた人員でも大規模かつ低成本な農業経営を行うことが重要です。そのため、農作業の効率化・省力化を促進する農業用ロボットの開発および栽培体系を最適化したロボット農作業一貫体系システムの開発が求められていました。



出典：「農林業センサス」、「農業構造動態調査」



出典：「営農類型別経営統計（個別経営）」

## 主要な成果

①衛星測位システムによる自動走行技術や障害物検出センサなど、農機のロボット化に不可欠な基礎技術を開発

→ ロボットトラクタなどの開発に寄与し、**作業時間を4割減**することが可能に

②ロボット及びロボット作業の基本事項、設計配慮事項、使用配慮事項等の要件を整理

→ 農業用ロボットの安全性確保に向けたガイドラインの策定に貢献し、**実用化に目途**



自動操舵システムによりステアリングを握らずにトラクタの直進走行が可能



無人ロボット作業と有人作業を組み合わせることで作業能率を向上



## きつい作業や危険な作業からの解放

# 農作業の軽労化に貢献するアシストスーツ



イメージ

## エネルギー消費量 最大3割削減で 農作業を軽労化

機械の導入が難しい急傾斜地での重い物の持ち上げ作業等を軽労化し、高齢者、女性、若手就農者でも楽に作業ができるアシストスーツを開発しました。

平成30年10月より市販化され、**農作業に着目したアシストスーツ開発の先駆け**となりました。今後、レンタルでの利用や周知活動によって普及拡大が期待されます。

令和2年には、ニューヨークのグッゲンハイム美術館において「**高齢化が進む日本の農村部の未来を変える技術**」として展示されました。見学者からは、高齢世代の活躍の場が広がることへの期待などの意見が寄せられています。



急傾斜地でも体への負担を減らして作業が可能



グッゲンハイム美術館での展示写真  
提供=早稲田大学、小林恵吾准教授

研究代表機関

和歌山大学

プロジェクト名

農業用アシストスーツの開発

研究期間

平成22年度  
～26年度

〔 共同研究機関：神奈川県、和歌山県、山口県、徳島県、香川県、大分県 ]

## 研究背景

農林水産業の現場には、機械化が難しく手作業に頼らざるを得ないきつい作業や、危険な作業が多く残されています。

果樹や園芸作では、人手による限られた期間での収穫作業や収穫物コンテナなどの運搬において、長時間にわたる厳しい作業姿勢や重いコンテナ等の持ち上げ作業が必要とされており、これらへの対応が求められています。



機械の導入が難しい急傾斜の果樹園



収穫物コンテナの運搬作業

## 主要な成果（アシストスースの特徴）

① 農作業特有の動きや様々な作業姿勢などに対応した農作業向けのアシストスースを開発

→ 10～30kg程度の収穫物の持ち上げ作業における負荷を半減し、腰痛等を予防

② アシストスースの利用により疲労度の軽減に効果があることを実証


→ エネルギー消費量が20～30%減少し、長時間作業の負荷を軽減

③ 軽労化効果について感性評価アンケートを実施して実用性を確認

→ 80～100%の軽労化評価を得て利用者にPR



アシストスースを使用した重量物の持ち上げ作業



アシストスースの利用による軽労化効果

## 広域水管理の最適化と水利施設の長寿命化

# 高度な用排水管理・最適化技術の開発




イメージ

## 最適な用排水管理で生産基盤の強化に貢献

高度な用排水管理が可能な**地下水位制御システム**の最適な利用方法について現場技術者用のマニュアルを作成し、地下水位制御システムの全国普及に貢献しました（地下水位制御システムの内 FOEASでは平成26年6,239ha→令和元年10,320ha）。

また、**新しい補修材料**の開発や保全技術について現場技術者用のマニュアルを作成し、老朽化が進む農業水利施設のストックマネジメント技術の向上に貢献しました。

水管理が高度化された水田群は、高収益作物の作付けなど農地として最大限の活用が期待されます。



## 研究背景

我が国の農業は、農地面積の減少、農業就業者の減少や高齢化が進行するなど、食料自給力を支える生産基盤の衰えが顕在化しています。

農業を持続し、食料を安定供給するためには、老朽化した農業水利施設の戦略的な保全管理が必要です。

農地をフル活用するために、広域の用水配分・排水管理にかかる技術的課題の解決が求められていました。



用水不良の水田



排水不良の水田

## 主要な成果

① 地下水位制御システムの最適な水利施設の管理・運用方法を解明


→ 不適切な広域用排水管理の改善に貢献

② 老朽化が進む既存水利施設を適切に評価し、低成本で回復・保全する技術を開発

→ 戦略的な保全管理が可能になり、水利施設の長寿命化に貢献

③ 土地改良事業等の現場技術者をサポートするための技術資料を作成

→ 全国の土地改良事務所に配布し、地下水位制御システムの施工面積拡大（地下水制御システムの内FOEASでは約4,000ha）に貢献



地下水位制御システムによる用排水の最適管理



新しい補修材料の開発

# デジタル空中写真と森林立体視ソフトで業務を効率化

## ITによる効率的な林分材積推定技術




イメージ

現地調査と  
同水準の精度で  
林分材積推定  
調査業務を  
4倍効率化

デジタル空中写真から読み取れる情報からスギやヒノキ、カラマツの幹の合計体積（林分材積）を求めるための推定式を開発し、森林立体視ソフトに適用することで、森林を伐採する際に、**現地調査へ行かなくても簡単に林分材積を推定**できるようになりました。

デジタル空中写真は森林組合などの林業の事業所でも安価に入手でき、**人手と時間を要する森林の現地調査業務の効率化**が期待されます。



デジタル空中写真を森林立体視ソフトで読みとる  
(3Dディスプレイと3Dメガネを使用)

方法	1日あたり 計測面積
現地調査 (4名チーム)	1.47 ha
立体視ソフト (単独作業)	1.24 ha

4名の現地調査と  
ほぼ同等の調査が  
1名で可能に！

現地調査と森林立体視ソフトによる作業効率の比較例

### 研究代表機関

森林研究・整備機構

### プロジェクト名

低コストな森林情報把握技術の開発

### 研究期間

平成25年度  
～29年度


## 研究背景

森林を伐採する際には、木材の収穫量や収支を見積もるための事前調査が欠かせません。人が森林の中を歩き回って、樹木の本数、樹高、幹の直径や土地の面積などを調べるのが現在でも一般的な方法であり、多くの人手と時間がかかります。

そこで、現地調査を行わずに、効率よく木材の収穫量を見積もるため、全国の多くの森林をカバーしており、比較的安価に入手できるデジタル空中写真を用いて林分材積（幹の合計体積）を推定する方法の開発に取り組みました。



現地調査の様子



航空機を用いたデジタル空中写真の撮影イメージ


## 主要な成果

① デジタル空中写真から読みとれる情報と現地調査によって得られる情報の対応関係を明らかに

→ 現地調査と同水準の精度で林分材積の推定が可能

② 平均樹高と本数から林分材積を求める推定式を樹種別、地域別に作成

→ 森林立体視ソフトと組み合わせることで、現地調査業務を約4倍効率化



材積推定

林分材積式を用いた材積推定手法  
標高計測 | 本数計測 | 材積推定 | 材積推定2 | 出力 |

パラメータ更新...

樹種 [スギ]  
地域 [東京都]

平均樹  m  
本数密  本/ha

パラメータ  
 $V = a \times H^b \times c$   
 $a [0.050540] b [2.035290] c [0.471670]$

材積値  
材積  m<sup>3</sup>/ha

材積を見積もった結果

◀ 調査地内を3Dディスプレイで立体視しながら、調査地全体の樹高と本数を計測



## カイコの全遺伝子情報の解析・利用と大量飼育システム

# カイコによる有用物質の効率的な生産技術



イメージ

1頭当たり  
タンパク質生産量  
を飛躍的に向上  
大量飼育システム  
で低コスト化


遺伝子組換えカイコを利用して、従来の方法では生産が困難であった**有用タンパク質を安定的に低コストで生産する技術**を開発しました。

このタンパク質を用いた**骨粗しょう症診断キット**はニットーボーメディカルによって平成24年に市販化され、順調に普及し、令和元年度には**178万テスト分出荷**されるまでになりました。（平成27年度民間部門農林水産研究開発功績者表彰において農林水産大臣賞を受賞）

同様の技術を用いて、カイコでしか作れない、またはカイコで作ると高機能になる**医薬品や化粧品**（抗体、ワクチン、コラーゲンなど）の開発が進められています。



骨粗しょう症診断薬

カイコの繭から抽出した  
ヒト型コラーゲンを利用した化粧品

## 研究代表機関

農業生物資源研究所

動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術開発

## 研究期間


平成19年度～  
23年度

## プロジェクト名

## 研究背景

生物由来の有用物質（タンパク質）は、その設計図となる遺伝子を、生産に適した生物に導入（遺伝子組換え）することで収量や品質の向上と効果的な利用が可能になります。従来の哺乳類培養細胞などを用いた方法では、大量生産に高いコストがかかるなどの問題がありました。

カイコが作る繭はほぼ100%がタンパク質（絹）からなり、遺伝子組換え技術を応用すれば絹以外のタンパク質を作らせて取り出すことができます。カイコが持つこの高いタンパク質生産能力をより高度に活かし、様々な有用タンパク質や他の方法では生産が困難な有用タンパク質をカイコで安定的に低コストで生産させるための技術開発を進めました。




カイコの遺伝子を組換え、カイコ体内で有用タンパク質を発現させる

## 主要な成果

① カイコの改良に役立つ全遺伝子情報の解析およびタンパク質の生産・抽出・精製法の高効率化 → 効率的なタンパク質生産に利用できる遺伝子を特定し、特定のタンパク質について1頭当たりの**生産量を従来比約13倍に増加**するシステムを構築

② カイコへの効率的な遺伝子導入技術の開発と大量飼育システムの開発 → 有用タンパク質の安定的な生産を可能にし、**低コスト化**



1頭当たりのタンパク質  
生産量が飛躍的に増加



屋外への拡散を防止する網室の中で育ち  
繭をつくる大量のカイコ（大量飼育システム）



## 高強度の新素材「改質リグニン」の開発・利用

# 木質リグニン由来の最先端工業材料



イメージ

木材から幅広く高付加価値素材へ応用可能、産業化へモデル構築



改質リグニン



リグニン活性炭素纖維



改質リグニンからの高付加価値素材

1,000億円を超える市場性

### 研究代表機関

森林総合研究所

### プロジェクト名

木質リグニンからの材料製造技術の開発

### 研究期間



平成24年度～27年度

[ 共同研究機関：岐阜県、北海道大学、(株)ドーコン、(株)日本触媒、ハリマ化成(株)、ユニチカ(株) ]

## 研究背景

リグニンは木材の約30%を占め、高い強度と耐熱性を有しています。一方で、樹種や部位で組成が構造が異なるなどバラツキが多いため、化学原料としての活用は困難でした。

その中で、日本固有のスギに含まれるリグニンは構造が比較的均一である点が特徴であり、工業原料として非常に有望な国産バイオマスとして期待されることから、この特性を生かすため、リグニンの分離法、高付加価値化等の技術開発を行うとともに森林からの供給システムに関する検討を行なうことが求められていました。



樹種別人工林面積比  
スギは4割を占める重要な木材

森林・林業統計要覧（2019）より

## 主要な成果

- ① リグニン系コンクリート混和剤の開発 → 現在広く使われている石油系混和剤より低用量でコンクリートの強度を向上
- ② リグニンの纖維化に関する基礎的なデータを収集し、応用性の高い製造技術を確立 → 吸着能に優れた活性炭素纖維や電子デバイスの作製など幅広い新機能素材の開発へ応用
- ③ 原料供給に関し、地域の条件に応じた環境性・経済性に優れた産業モデルを提示 → リグニンの生産を各地域ごとに最適化



地域に応じた産業モデルを考案し、最適な生産が可能に

◀ 混合剤添加で流動性が向上し、コンクリート強度が高まる



問合せ先

農林水産技術会議事務局 研究開発官（基礎・基盤、環境）室



03-6744-2216

## 注目の業務・加工用多収品種

# 中食・外食のニーズに応える水稻新品種



イメージ

全国的に生産可能で9県で产地  
品種銘柄登録、  
消費拡大へ


業務・加工用に適した多収水稻品種「とよめき」を育成しました。関東地方では、「とよめき」の栽培面積が250ha以上（令和元年）となり、今後もさらなる拡大が見込まれます。

また、これと併せて、多収で炊飯米が粘りすぎないなど実需が求める品質を両立する栽培技術を開発したこと、中食・外食産業のニーズに応えました。

今後も需要増が見込まれる業務・加工用米が安定的に供給に貢献することが期待されます。



多収な「とよめき」の立ち姿



「とよめき」栽培面積の推移

※農産物検査結果から換算  
(2019年産は令和2年3月31日現在の速報値)

## 研究代表機関

農研機構

## プロジェクト名

実需者のニーズに応じた超多収良食味業務用  
及び超多収加工用水稻品種等の開発


## 研究期間

平成26年度  
～30年度

## 研究背景

近年、中食・外食向けなど、業務・加工用米の需要が急増しており、安定的な供給が課題となっていました。

そこで、おにぎりや冷凍米飯などの加工に適し、低成本生産が可能な多収品種の育成や、業務・加工用適性を維持しつつ、安定的に多収となる栽培技術の開発が求められました。



資料：農林水産省「米の1人1ヶ月当たり消費量」  
米穀機構「米の消費動向調査」

米の消費における中食・外食の割合は増加している



加工米飯の一例


## 主要な成果

① 各地域向けに、業務・加工用に適した多収水稻品種「とよめき」や「雪ごぜん」等を育成

→ 全国的な生産が可能になり、**9県で産地品種銘柄に登録**（令和2年時点）

② 生育診断による追肥量の決定などで、多収と業務・加工用品質を両立できる栽培技術を開発し、マニュアルを作成

→ マニュアルは**合計1万部以上発行**され、ポスター発表や講演会を通じて広く全国に周知



実需者の求める  
炊飯米への適性を評価



ポスター発表や講演会による周知活動

## カドミウム低吸収品種と水管理によるリスク低減

# お米のヒ素・カドミウムを同時低減する技術



イメージ

お米に意図せずして含まれる**ヒ素やカドミウムを同時に低減する栽培管理技術を開発し、行政指針等の策定**に貢献しました（「コメ中のカドミウム低減のための実施指針」「コメ中ヒ素の低減対策の確立に向けた手引き」）。

今後、地域ごとに、カドミウムをほとんど吸収しないイネ品種の育成とヒ素を低減させる水管理を中心とした栽培管理技術の確立・実証が進み、技術が全国に普及することで、**ヒ素やカドミウムがより少ないお米が生産されることが期待**されます。

**ヒ素とカドミウムを同時に低減したお米の生産を可能とする技術、行政指針の策定に貢献**

コメ中のカドミウム低減のための実施指針

消費・安全局

農林水産省

コメ中ヒ素の低減対策の確立に向けた手引き

平成31年3月  
農林水産省

行政指針等へ反映



地域にあった栽培管理技術の確立・実証

### 研究代表機関

農研機構

### プロジェクト名

水稻におけるヒ素のリスクを低減する栽培管理技術の開発

### 研究期間

平成25年度～29年度


〔 共同研究機関：北海道、青森県、岩手県、秋田県、栃木県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、長野県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、山口県、熊本県、島根大学、(株)住化分析センター 〕

## 研究背景

自然環境中に広く存在するヒ素やカドミウムは、栽培によって作物に吸収されるため、様々な農産物が、意図せずしてごく微量のヒ素やカドミウムを含みます。

このような意図せずして食品に含まれる有害化学物質については、「生産から消費にわたり適切な措置を講じて合理的に達成が可能な範囲で食品に含まれる量をできるだけ低くすべき」というのが、国際的に合意された「リスク管理」の考え方です。日本人が食品から摂取するカドミウムとヒ素については、お米を通して摂取する割合が大きいことが明らかになっていきます。

イネの栽培では、水を張る（湛水）とヒ素が、逆に水を切らす（落水）とカドミウムが吸収されやすくなります。これらの正反対の性質を持つ有害元素を同時に低減する技術の開発が求められていました。




### 主要な成果

① カドミウムをほとんど吸収しない品種を湛水と落水を繰り返して栽培することで、玄米中のカドミウム濃度を極めて低く保ちながら、ヒ素濃度を低減する技術を開発


→ ヒ素とカドミウムの濃度が同時に低水準となるお米の栽培管理手法を提示

② 開発した技術が行政指針等に反映

→ 科学的な根拠に基づいた行政指針等により、全国で普及に向けた現場実証が加速



湛水と落水を繰り返すことで、常に湛水する場合に比べ、玄米中のヒ素濃度を低くできる



炊飯後でも変色しにくく、良食味

## 健康機能性が話題のもち麦「キラリモチ」



イメージ

変色しにくく  
食味に優れ  
健康志向にマッチ  
広い地域で普及




「キラリモチ」商品例

機能性成分  $\beta$ -グルカンを高含有し、炊飯した後の見た目や食味の良いもち性大麦（もち麦）「キラリモチ」を開発しました。

「キラリモチ」を活用した食後血糖値の上昇を抑制する効果等を掲げた機能性表示食品が開発される等、健康機能性がメディアでも取り上げられ、国産のもち性大麦の需要が大きく増加しています

**(平成26年: 106トン→令和2年: 12,972トン**  
(速報値) )。

平成29年に茨城県で奨励品種に採用されてから6道県で産地品種銘柄となり、  
**平成30年産で約460トン、令和元年産で約1,500トン生産**され、年々増加しています。



## 研究代表機関

農研機構

## プロジェクト名

低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発


## 研究期間

平成18年～平成22年


〔 共同研究機関 : - ]

## 研究背景

健康志向の高まりから、食物纖維 $\beta$ -グルカンを多く含む大麦が注目されるようになりました。しかし、一般的な大麦は炊飯後に変色しやすく、利用拡大の妨げになっていました。このため、炊飯後にも変色程度が少なく白度を高く保ち、食味が優れる品種が求められていました。



従来品種の炊飯後の色の変化



## 主要な成果（「キラリモチ」の特徴）

- ① 炊飯後の変色の原因となるプロアントシアニジン（ポリフェノールの一種）が含まれていない
  - ② 関東以西の温暖地向けの品種であるが、北海道でも春播栽培が可能
  - ③ うるち性品種より機能性成分の $\beta$ -グルカンが約1.5倍多く含まれる
- 炊飯後の変色がほとんど見られない。**麦ご飯が白いまままで食べられ、商品性が高い**
- 茨城県の奨励品種、北海道、埼玉県、滋賀県、兵庫県、岡山県、広島県の産地品種銘柄に設定されるなど、**広い地域で普及**
- 「キラリモチ」を活用した食後血糖値の上昇を抑制する効果等を掲げた機能性表示食品が開発。**健康志向の消費者に強くアピール**



キラリモチ

従来品種

◀ 「キラリモチ」は炊飯後、変色しにくい  
(18時間保温後の炊飯麦を比較)

「キラリモチ」を用いた機能性表示食品▶



写真提供：(株)マエダ

# DNAマークー利用で難裂莢性遺伝子をピンポイント導入 莢がはじけにくく収穫ロスが少ない大豆



イメージ


加工適性、栽培方法はそのままに実質的収量4割増の事例も

主要大豆品種「フクユタカ」の収穫ロスを少なくするため、莢をはじけにくくする遺伝子をピンポイントで導入した品種「**フクユタカA1号**」を開発しました。実質的収量が増え、生産者の収益が増加するとともに、豆腐などへの加工適性は変わらず、実需者からも好評です。

**愛知県**では、令和2年より従来品種「フクユタカ」から「フクユタカA1号」へ**全面的に置換え(4,500 ha)**を開始しており、今後も全国的な拡大が見込まれます。実需者からの引き合いの強い国産大豆が安定的に供給されることで、国産農産物のさらなる需要拡大が期待されます。



実需と連携しながら開発したこと、速やかな普及が可能に  
現地検討会の様子(左)、シンポジウムにて周知活動(右)



品種が変わってもこれまでと  
変わらぬ豆腐や納豆を提供

## 研究代表機関

農研機構

## プロジェクト名

実需者等のニーズに応じた加工適性と広域適応性を持つ  
大豆品種等の開発

## 研究期間

平成26年度  
～30年度

## 研究背景

大豆は、豆腐など日本の食卓に欠かせない食品の原料ですが、自給率が低く、実需者のニーズに応えるには生産の拡大、安定供給が重要です。

大豆は成熟すると莢がはじけて子実を地面に落としてしまうため、収穫時に機械が莢をはじき飛ばし、収穫ロスによる収量減につながっていました。

そこで、莢がはじけにくく、栽培方法や加工適性は従来品種と同等の品種を短期間で育成することが求められていました。



収穫前の大豆（左）



コンバイン収穫後に子実が落ちこぼれた様子（右）


## 主要な成果

- ① DNAマークを利用して、莢をはじけにくくする遺伝子のみをピンポイントで導入した「フクユタカA1号」を短期間で育成 → 見た目や加工適性等の特徴は「フクユタカ」とほぼ同等で、栽培方法の変更は不要
- ② 難裂莢性で莢がはじけにくい → 実質的な収量が最大4割向上することを収穫試験で確認
- ③ 実需者による加工試験で、原品種「フクユタカ」とほぼ同等という評価 → 確実な需要が見込める



原品種  
「フクユタカ」

難裂莢性品種  
「フクユタカA1号」



コンバイン収穫試験では実質的な収量が増加



## 端境期に対応する新品種、栽培技術の体系化

# 業務・加工用タマネギ、キャベツの開発




イメージ

輸入品に依存していた端境期への国産品の安定供給が可能に

端境期に収穫が可能なタマネギ「マルソーソー」、「オーロラ」と、省力・低コスト化が可能なタマネギ直播栽培技術を開発しました。東北地域ではこれら春まきタマネギの作付けが進み（令和元年 80 ha）、今後も拡大が見込まれます。

寒玉キャベツについても、供給が不足する4～5月どりの加工歩留まりが高い新品種「YR503」及び「NNS-C-91」を育成しました。新品種の種子は令和3年夏に販売開始予定で、今後の栽培が見込まれます。

業務用のタマネギ・キャベツが不足しやすい端境期に安定的に供給可能となることで、国産農産物の需要拡大が期待されます。



### 研究代表機関

農研機構

### プロジェクト名

実需者等のニーズに応じた加工適性を持つ野菜品種等の開発

### 研究期間


平成26年度～30年度

[ 共同研究機関：青森県、茨城県、富山県、カネコ種苗(株)、(株)明治機械製作所、(株)渡辺採種場 等 ]

## 研究背景

野菜の業務・加工用需要の割合は全体の6割に達していますが、気候の影響を受けやすい露地野菜では、供給が不安定になる端境期がありました。

端境期が生じやすい業務・加工用タマネギ、キャベツでは輸入への依存度が高く、実需ニーズに沿った国産品の安定供給が求められました。



国産および輸入野菜の用途別仕向け量 (2015年)


## 主要な成果

① タマネギの端境期（7～8月）に収穫できる新品種を育成。直播栽培における省力的減肥技術を体系化

→ 東北地域の冷涼な気候を活用した**端境期出荷、水田の有効活用**が可能

② 寒玉キャベツの端境期（4～5月）に収穫可能な新品種を育成、品種登録出願

→ 芯や花芽の割合が少なく、**加工歩留まりが高い**という特徴を併せ持ち、普及に期待




端境期（7～8月）に収穫できるタマネギの新品種「マルソー」



端境期（4～5月）に収穫できるキャベツの新品種「YR503」



タマネギ直播におけるリン酸直下施肥技術の改良



4,5月どり寒玉系キャベツ品種  
芯や花芽の割合が小さく、加工歩留まりが高い

# カットフルーツ向けカンキツ、セミドライ赤果肉リンゴ 実需ニーズに応える加工用果樹品種・技術



育成した「あすき」

**品質・外観・機能性に優れ、付加価値が高く、加工品の需要拡大に期待**

高糖度で液だれが少ないなど、カットフルーツ適性に優れたカンキツ「**あすき**」

(平成29年11月出願公表) や、食感・風味が改善され、きれいな赤さも維持された**赤果肉リンゴ乾燥技術**を開発しました。

カットフルーツの品質向上、赤果肉リンゴのセミドライ品を使った特徴的で多様な加工品の製造技術等、**実需者ニーズに応える加工用果実の提供に貢献**し、果物の利用拡大が期待されます。



赤肉リンゴセミドライ品を使った「おこし」

**研究代表機関**

農研機構

**プロジェクト名**

実需者等のニーズに応じた加工適性を持つ果樹品種等の開発

**研究期間**


平成26年度～30年度

〔 共同研究機関：埼玉県、長野県、鳥取県、熊本県、近畿大学、東京大学、(一社)長野県農村工業研究所 〕

## 研究背景


近年、ジュース用に比べて高価格で原料果実が取引されている、カットフルーツ等の果実加工品の需要が増えています。

需要に応えるため、より多様な原料が求められ、加工用に適した品種や、既存の品種で視覚的にインパクトのある赤果肉リンゴの効率的な加工技術の開発が求められていました。



食料支出に占める果実の割合、果実支出に占める果実加工品の割合（総世帯）  
注：果実加工品にジュースは含まれない

資料：総務省家計調査



加工向け生産量および原料価格  
(資料：農林水産省「品目別経営統計」、生産流通振興課調べ)

## 主要な成果


① 液だれが少なく、糖度が極めて高く、食味も優れるカンキツ「あすき」を育成

→ 加工品にした際の液だれによる外観不良が少なく、実需者からの需要が高い


② 機能性成分を高く保持したまま赤果肉リンゴを加工品へ利用する手法を開発

→ 付加価値が高いリンゴ加工品の提供により、需要拡大が期待できる

「あすき」  
(開発品種)



「たまみ」  
(従来品種)



「あすき」の液だれは少ない



赤果肉リンゴ



機能性成分等を高く  
保持したセミドライ品

## 高温期の日持ち性向上、品質保持

# 夏場における花きの安定供給技術



イメージ

夏期の生産コスト  
2割減や日持ち性  
2倍、  
夏の高温期も彩り  
豊かな緑化を実現

夏は花壇の植栽を美しく維持することが非常に難しい季節ですが、ビンカやペントスなど夏に栽培できる品目やその植栽技術を「[夏花による緑化マニュアル](#)」にまとめました。現在、都立公園を中心に[都内50か所以上](#)の植栽に活用されており、今後、夏の彩りが増えていきます。

また、暑さに負けない[日持ち性に優れたダリア新品种](#)や、キクやカーネーション等の様々な[切り花の収穫後の低温管理技術](#)を開発しました。良質な花きの安定供給と国内消費拡大の推進により、国産花きのシェア拡大に貢献します。



夏の花壇は暑さや乾燥で株枯れが多発



彩り豊かな日比谷公園の装飾

## 研究代表機関

農研機構

## プロジェクト名

国産花きの国際競争力強化のための技術開発

## 研究期間

平成27年度  
～令和元年度


〔 共同研究機関：秋田県、千葉県、東京都、愛知県、奈良県、香川大学、日本大学、トヨタネ（株） 等 〕

## 研究背景

国内の花きは生産額、生産者数とともに減少し、輸入が増加していることから、国際競争力強化のための技術開発が求められました。

また、特に近年夏は、気温が著しく高くなり、植物の栽培や切り花の日持ちに影響を与えており、例えば苗ものの7～9月の出荷数は、5月や11月と比較して著しく減少しています。

そこで、夏の高温期でも安定供給が可能な、新品種、低成本安定生産技術、品質保持期間延長技術の開発が求められていました。



月別苗ものの出荷数 東京都卸売市場統計（2019）

## 主要な成果

① 夏に栽培できる品目、品種の植栽技術をまとめた「夏花による緑化マニュアル」を作成

→ 初心者でも取り組むことが可能となり、隅田川テラスなど**都内50カ所以上**の植栽に活用

② 日持ち性を向上させたダリア3品種を育成

→ 従来品種の2倍である**10日間の日持ち**が可能となり、お盆等での安定供給が可能

③ 間欠冷房や根域温度制御による省エネ栽培技術、日持ち性を向上する低温品質管理技術等を開発

→ **夏期における生産コストの2割削減**や**日持ち性1.5倍**等を達成し、安定供給が可能



従来品種の約2倍(10日)日持ちするダリア新品種



間欠冷房技術と細霧冷房によるコチョウランの低コスト高品質生産

低コスト高品質生産技術の組合せ

- ①ヒートポンプ（温度制御）
- ②高压細霧冷房
- ③遮光カーテン
- ④植物生長調節剤



# 多収品種の低成本栽培技術、特長ある畜産物生産 飼料用米による畜産物の高付加価値化



イメージ

**水田フル活用を進め、畜産物の高付加価値化・ブランド化を推進**

**飼料用米を給与して、特長のある畜産物を生産**する技術を開発しました。これを活用した畜産物の高付加価値化・ブランド化の取組や、開発した多収品種や低成本栽培技術により、飼料用米の生産拡大に寄与し、生産者の収益向上への貢献が期待されます。

今後、水田を活用した飼料用米の生産拡大が進み、飼料自給率や収益が向上することで、**より安定した畜産経営に貢献**していくことが期待されます。



育成した多収品種「きたげんき」を栽培した生産者が飼料用米多収日本一で表彰 (968kg/10a)



2013年「食肉産業展」にて「銘柄ポーク好感度コンテスト」の最高賞を受賞

## 研究代表機関

農研機構

## プロジェクト名

自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発（他）


## 研究期間

平成22年度～26年度

## 研究背景

日本の畜産業は輸入飼料への依存度が高く、国際飼料価格が不安定で、為替変動の影響により配合飼料価格が高止まりしており、飼料の自給率向上が求められていました。

一方、優れた生産基盤である水田の機能維持には、食用米だけでなく飼料生産を含めた水田のフル活用が重要となっていました。



H30 濃厚飼料の自給率



配合飼料（工場渡し）価格の推移

## 主要な成果

① 多収の飼料用米品種「オオナリ」(10a当たり1t)等を育成、飼料用米の低コスト栽培技術を開発

→ **国産濃厚飼料である飼料用米の生産拡大に貢献**

② 品質の高い稻発酵粗飼料の生産および調製方法を開発

→ **乳用牛・肉用牛での水田由来粗飼料の利用拡大に貢献**

③ 飼料用米を給与し、風味の良い豚肉やうまい味が増した鶏肉など特長のある畜産物を生産する技術を開発

→ **畜産物の高付加価値化・ブランド化による収益性向上**



1t/10aに近い収量性の  
飼料用米品種「オオナリ」



飼料用米を給与した  
名古屋コーチン

## 高度堆肥脱臭システム、臭気マッピング手法の開発

# 畜産経営における悪臭低減技術の高度化




イメージ

苦情の過半を占める「悪臭」を見える化、アンモニアを9割以上除去

畜産に起因する悪臭の低減に向けて、堆肥化処理施設から発生するアンモニアを9割以上除去することができる「**高度堆肥脱臭システム**」を開発し、熊本県や鹿児島県で導入されています。

また、農場全体の臭気の状況を把握できる「**臭気マッピング手法**」を開発し、栃木県では、本手法を活用して20件以上の畜産農家で悪臭分布を調査し、カーテンなどの臭気対策を実施しています。

今後、実施設へシステムを導入することで、周辺への臭気漏れを防止し、**畜産経営への理解が進むことが期待**されます。



悪臭低減！



畜産経営への理解促進！



## 研究代表機関

農研機構

## プロジェクト名

畜産・酪農の生産力強化のための技術開発


## 研究期間

平成27年度～29年度

## 研究背景

畜産に起因する苦情は「悪臭」に関するものが過半を占めています。

そこで、対策技術の開発が進んでいないふん尿処理過程からの悪臭の発生、拡散を低減する技術の開発が求められていました。



平成30年度苦情別発生割合  
(出典: 農林水産省畜産部調べ、  
農林水産省「畜産統計」)



臭気が問題となる堆肥化処理施設


## 主要な成果

① 堆肥化処理施設に、堆肥脱臭と酸・アルカリ溶液噴霧脱臭を組み合わせた技術を導入し、「高度堆肥脱臭システム」を開発

→ 特定悪臭物質であるアンモニアを9割以上除去

② ニオイセンサとGPSを組み合わせた「臭気マッピング手法」を開発

→ 農場全体の臭気の状況の俯瞰的な把握を可能とし、対策の対象を明確化



# 人工シラスウナギの大量生産システム 天然資源に依存しないウナギ養殖技術



イメージ

**人工シラスウナギ  
の大量生産シス  
テムを開発、  
完全養殖の商業化  
に道筋**

成長が不安定だった**人工シラスウナギの  
大量生産システム**を開発し、天然シラスウ  
ナギと遜色ない人工シラスウナギを育てる  
ことができるようになりました（令和元年  
6月）。

現在は人工シラスウナギの商業規模での  
供給に向けた実証試験を行っています。

今後、人工シラスウナギを大量に安定供  
給できるようになれば、採捕量が減少して  
いる**天然資源に依存しないウナギの完全養  
殖を商業化**できると期待されます。



大量生産が可能になった人工シラスウナギ



人工シラスウナギから育てた完全養殖ウナギ

**研究代表機関**

水産研究・教育機構

**プロジェクト名**

シラスウナギの安定生産技術の開発

**研究期間**平成24年度～  
平成28年度



〔 共同研究機関：静岡県、近畿大学 ]

## 研究背景

日本人にじみ深いウナギは、その食用のほとんどが養殖されたものです。使われる稚魚（シラスウナギ）は全て沿岸で採捕される天然のものです。

しかし、シラスウナギの採捕量が年々減少傾向にあるため、人工シラスウナギの供給を求める声が高まりました。平成22年には、人工シラスウナギを親に育てて次世代を誕生させるウナギの完全養殖に成功しましたが、人工シラスウナギの生産は非常に不安定で、少量ずつ手間をかけて育てる必要がありました。

このため、シラスウナギを大量生産する安定生産技術を開発しました。



## 主要な成果

- ① ウナギ由来の成熟ホルモンによる採卵技術を開発 → 飼育下では産卵しないウナギから**良質な卵を安定して確保**できるようになり、商業提供に目途
- ② 餌料効率の高い新しい人工の餌を開発 → シラスウナギまでの**成長・生残が向上**し、安定的な生産が可能に
- ③ 大型水槽を用いた新たな飼育システムを開発 → **大量生産が可能**になり、シラスウナギの商業生産に道筋



新しい人工飼料を開発



従来の小型水槽による飼育管理



大量生産システム

## 重要病害虫70種の遺伝子解析、遺伝子マーカー開発


# 遺伝子情報による重要病害虫迅速同定法



数日要していた  
重要病害虫の  
同定を24時間以内  
に短縮

国内への侵入や分布拡大が懸念されている病害虫について、**遺伝子情報による迅速な同定方法を開発**し、見た目だけでは識別が難しい植物病変や昆虫の卵・幼虫なども、**サンプルを採取してから24時間以内に種を同定**できるようになりました。

この技術は今後、**全国の植物防疫所等に導入**され、植物検疫での検出力のさらなる向上や、国内侵入時の迅速な防除対策に活用され、国内への新たな病害虫の侵入リスクの低減に貢献することが期待されます。



研究代表機関

農研機構

プロジェクト名

有害動植物の検出・同定技術の開発

研究期間

平成27年度  
～令和元年度

## 研究背景

温暖化やヒト・モノの動きのグローバル化によって、新たな病害虫の侵入リスクが増大しており、植物検疫によって海外からの病害虫の侵入を阻止すること、また、万が一侵入した場合には速やかにその種を特定して防除することが重要です。

ところが、侵入病害虫のなかには、見た目だけでは識別が難しいものがあり、初動対策の遅れなどによる侵入リスクが高いことが懸念されます。そこで、見た目に依存しない遺伝子情報を用いた迅速な同定方法を開発することが求められていました。



キャベツの根に寄生したテンサイシストセンチュウ



ジャガイモやせいもウイロイドに感染したジャガイモ

今後国内での発生が警戒されている病害虫

## 主要な成果

① 重要病害虫70種（トスボウイルスやアザミウマ類等）について、遺伝子情報による同定方法を開発


→ 今後国内への侵入・分布が懸念されている病原菌について、これまで**同定に数日以上要していたところ、24時間以内の迅速な同定が可能**

② カンキツグリーニング病菌について、国内の個体群と海外の個体群を識別するための遺伝子マーカーを開発


→ 国内的一部地域で発生している病害について個体群を正しく同定することで**効率的な防除が可能**

③ 上記の情報をデータベース化

→ データの整理・共有により**防疫体制を強化**



ジャガイモやせいもウイロイド（PSTDv）  
高病原性株のHRM解析による識別



国内未侵入のネコブセンチュウ  
3種のPCRによる識別



## 表土削り取りやカリ施肥など除染技術を体系化

# 農地等の放射性物質の除去・低減技術



イメージ

農地等の除染技術の開発により、早期営農再開に貢献

東日本大震災に伴う原発事故が原因で利用が困難になった農地の回復に向けて、除染用農機の開発を行い、市販化された**表土削り取り機は飯館村等に10台が導入されました。**

また、ダイズ・ソバ・牧草への放射性セシウムの移行を低減するため、吸収抑制効果のある土壌中のカリ含量目標値を明らかにし、**行政マニュアルや被災県の指針策定に貢献**しました。この目標値は生産現場で施肥の目安として活用されています。

体系的な除染技術の開発により水田、畑作および畜産での**早期営農再開に貢献**しています。



成果はマニュアル等にまとめられ  
生産現場に提供



原子力被災12市町村の  
営農休止面積のうち、  
**営農再開面積は約3割**



一層の営農再開に向けて  
普及促進！

#### 研究代表機関

農研機構

#### プロジェクト名

農地等の放射性物質の除去・低減技術の開発

#### 研究期間

平成24年度  
～27年度

[ 共同研究機関：森林研究・整備機構、日本原子力研究開発機構、宮城県、福島県、栃木県、福島大学 ]


## 研究背景

東日本大震災に伴う原発事故で環境中に放射性物質が放出され、農地の利用を休止せざるをえない事態となっていました。

そのため、被災地での早期の営農再開に向けて、農地の除染技術や作物への放射性物質移行を低減する技術の確立が求められていました。



地上 1 cm の放射線濃度の測定状況



福島県の農地土壤の放射性物質濃度分布図（平成23年）

## 主要な成果

① トラクタ装着式の表土削り取り機や、無線トラクタを用いた傾斜草地での除染作業技術など除染技術体系を確立

→ 原子力被災12市町村における**営農休正面積17,298haのうち、5,038haの営農再開に貢献**

② 土壤から作物への放射性セシウムの移行を低減するための土壤中交換性カリ含量の目標値を明らかに

→ 生産現場での施肥の目安として、**福島県等で指針として採用**



表土削り取り




無線トラクタによる傾斜草地での耕うん作業



水田土壤の攪拌・凝集でセシウム除去



洗浄による畜舎・パドックの汚染除去



土壤中のカリ濃度が適正な場合、放射性セシウムの吸収は抑制される



## 農林水産省ホームページも是非御覧ください！

本成果集のweb版を掲載している他、  
関連するシンポジウム情報や論文情報など、  
詳細を知りたい方に向けた情報を掲載しています。

HPアドレス：

[https://www.affrc.maff.go.jp/docs/  
project/seika/index.html](https://www.affrc.maff.go.jp/docs/project/seika/index.html)



委託プロジェクト成果集

検索

二次元バーコードからも御覧いただけます

## 「みどりの食料システム戦略」の詳細はこちら

「みどりの食料システム戦略」についての説明動画や  
パンフレットなど、詳細な情報を掲載しています。

HPアドレス：

[https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/  
seisaku/midori/index.html](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html)



みどりの食料システム戦略

検索

二次元バーコードからも御覧いただけます

この資料に関するお問い合わせ先

農林水産省

農林水産技術会議事務局 研究企画課

〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関 1 - 2 - 1

TEL : 03-3501-4609 FAX : 03-3507-8794

各課題に関するお問い合わせは各ページに記載されている  
お問い合わせ先までお願ひいたします。

# みどりの食料システム戦略（概要）

～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

Measures for achievement of Decarbonization and Resilience with Innovation (MeaDRI)

令和3年5月  
農林水産省

## 現状と今後の課題

- 生産者の減少・高齢化、地域コミュニティの衰退
- 温暖化、大規模自然災害
- コロナを契機としたサプライチェーン混亂、内食拡大
- SDGsや環境への対応強化
- 国際ルールメーキングへの参画

「Farm to Fork戦略」(20.5)  
2030年までに化学農薬の使用及びリスクを50%減、有機農業を25%に拡大

「農業イノベーションアジェンダ」(20.2)  
2050年までに農業生産量40%増加と環境フットプリント半減

農林水産業や地域の将来も見据えた持続可能な食料システムの構築が急務


持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」を策定し、中長期的な観点から、調達、生産、加工・流通、消費の各段階の取組とカーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進

## 目標と取組方向

### 2050年までに目指す姿

- 農林水産業のCO<sub>2</sub>ゼロエミッション化の実現
- 低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及に加え、ネオニコチノイド系を含む従来の殺虫剤に代わる新規農薬等の開発により化学農薬の使用量（リスク換算）を50%低減
- 輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30%低減
- 耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25%（100万ha）に拡大
- 2030年までに食品製造業の労働生産性を最低3割向上
- 2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現を目指す
- エリートツリー等を林業用苗木の9割以上に拡大
- ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率100%を実現

ゼロエミッション持続的発展



### 戦略的な取組方向

2040年までに革新的な技術・生産体系を順次開発（技術開発目標）

2050年までに革新的な技術・生産体系の開発を踏まえ、

今後、「政策手法のグリーン化」を推進し、その社会実装を実現（社会実装目標）

※政策手法のグリーン化：2030年までに施策の支援対象を持続可能な食料・農林水産業を行う者に集中。

2040年までに技術開発の状況を踏まえ、補助事業についてカーボンニュートラルに対応することを目指す。

補助金拡充、環境負荷軽減メニューの充実とセットでクロスコンプライアンス要件を充実。

※革新的な技術・生産体系の社会実装や、持続可能な取組を後押しする観点から、その時点において必要な規制を見直し。

地産地消型エネルギー・システムの構築に向けて必要な規制を見直し。

## 経済

### 持続的な産業基盤の構築

- ・輸入から国内生産への転換（肥料・飼料・原料調達）
- ・国産品の評価向上による輸出拡大
- ・新技術を活かした多様な働き方、生産者のすそ野の拡大

## 社会

### 国民の豊かな食生活 地域の雇用・所得増大

- ・生産者、消費者が連携した健康的な日本型食生活
- ・地域資源を活かした地域経済循環
- ・多様な人々が共生する地域社会

## 環境

### 将来にわたり安心して暮らせる地球環境の継承

- ・環境と調和した食料・農林水産業
- ・化石燃料からの切替によるカーボンニュートラルへの貢献
- ・化学農薬・化学肥料の抑制によるコスト低減

アジアモンスター地域の持続的な食料システムのモデルとして打ち出し、国際ルールメーキングに参画（国連食料システムサミット（2021年9月）など）

# みどりの食料システム戦略（具体的な取組）

～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

## 調達

### 1. 資材・エネルギー調達における脱輸入・脱炭素化・環境負荷軽減の推進

(1) 持続可能な資材やエネルギーの調達

(2) 地域・未利用資源の一層の活用に向けた取組

(3) 資源のリユース・リサイクルに向けた体制構築・技術開発

～期待される取組・技術～

- 地産地消型エネルギー・システムの構築
- 改質リゲン等を活用した高機能材料の開発
- 食品残渣・汚泥等からの肥料成分の回収・活用
- 新たなタンパク資源（昆虫等）の利活用拡大等

## 生産

### 2. イノベーション等による持続的生産体制の構築

- 高い生産性と両立する持続的生産体系への転換
- 機械の電化・水素化等、資材のグリーン化
- 地球にやさしいスーパー品種等の開発・普及
- 農地・森林・海洋への炭素の長期・大量貯蔵
- 労働安全性・労働生産性の向上と生産者のすそ野の拡大
- 水産資源の適切な管理

～期待される取組・技術～

- スマート技術によるピンポイント農薬散布、次世代総合的病害虫管理、土壤・生育データに基づく施肥管理
- 農林業機械・漁船の電化等、脱プラ生産資材の開発
- バイオ炭の農地投入技術
- エリートツリー等の開発・普及、人工林資源の循環利用の確立
- 海藻類によるCO<sub>2</sub>固定化（ブルーカーボン）の推進等

## 消費

### 4. 環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進

(1) 食品ロスの削減など持続可能な消費の拡大

(2) 消費者と生産者の交流を通じた相互理解の促進

(3) 栄養バランスに優れた日本型食生活の総合的推進

(4) 建築の木造化、暮らしの木質化の推進

(5) 持続可能な水産物の消費拡大

～期待される取組・技術～

- 外見重視の見直し等、持続性を重視した消費の拡大
- 国産品に対する評価向上を通じた輸出拡大
- 健康寿命の延伸に向けた食品開発・食生活の推進

## 加工・流通

### 3. ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立

(1) 持続可能な輸入食料・輸入原材料への切替えや環境活動の促進

- データ・AIの活用等による加工・流通の合理化・適正化
- 長期保存、長期輸送に対応した包装資材の開発
- 脱炭素化、健康・環境に配慮した食品産業の競争力強化

～期待される取組・技術～

- 電子タグ（RFID）等の技術を活用した商品・物流情報のデータ連携
- 需給予測システム、マッチングによる食品ロス削減
- 非接触で人手不足にも対応した自動配送陳列等

# 農林水産研究 推進事業の取組

令和3年度版

農林水産省